



Сибирский осётр

Acipenser baeri (Brandt, 1869)

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes

Семейство Осетровые – Acipenseridae

Средних размеров осетровая рыба с треугольной головой, покрытой костными щитками сверху и с боков. Тело вытянутое, сужающееся к хвосту, покрыто пятью рядами костных пластинок – жучек. Рыло удлинённое, рот небольшой, нижний. Хвостовой плавник неравно лопастный: верхняя лопасть длинная, заострённая, значительно превышает по длине нижнюю. Окраска головы и туловища сверху и с боков – серо-зелёная, брюхо – желтоватое, плавники – тёмные. Длина особей достигает 141 см, масса – до 21 кг.

Сибирский осётр обитает в текущих пресных водах, предпочитая русловые и дельтовые участки рек. Зимует в глубоких ямах. Поднимается вверх по течению на значительные расстояния – до 1300 км для нереста. В бассейне Колымы половая зрелость наступает в возрасте 16-18 лет при длине 82-87 см и массе 2,6-3,6 кг. Нерест происходит один раз в 3-4 года, в июле – начале августа. Основные нерестилища находятся примерно в 900 км от устья, в районе устья р. Ожогина. Растёт вид медленно: особь длиной 124 см и массой 9,6 кг может быть возрастом 37 лет. В Магаданской области встречается в бассейне Колымы: по основному руслу реки до посёлка Сеймчан, а также в устьевых участках рек Коркодон и Сугой.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019