



Касатка

Anas falcata Georgi, 1775

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Небольшая утка массой 0,6-0,75 кг. Самец имеет яркую окраску, в отличие от более скромной самки, которая похожа на самку кряквы, но заметно меньшая по размеру и с тёмным клювом. Селезень с белым горлом, ниспадающим с затылка хохлом и перьями-косицами на крыле. В полёте сбоку на тёмном подхвостье видно белое пятно. Спина и основание хвоста образуют светлый клин, окружённый чёрным – в отличие от кряквы. На крыльях заметно «зеркальце», как у свиязи, но на воде касатка выглядит стройнее и имеет более длинный клюв.

Касатка предпочитает пойменные и припойменные кустарниковые ландшафты. Встречается на Охотском побережье – здесь проходит северо-восточная граница её ареала. Во время весенней миграции, после зимовки в Юго-Восточной Азии, касатка регулярно наблюдается в поймах рек и на озёрах Кава-Челомджинского междуречья. Есть основания полагать, что она гнездится именно там. На территории Магаданской области касатка проникает из Хабаровского края. Её гнездовой ареал простирается, по меньшей мере, до бассейна реки Ола.

Фото И. Дорогой