

## Краснозобик

Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes Семейство Бекасовые — Scolopacidae

Песочник среднего размера, массой 60-65 г. Клюв длинный, слегка изогнут вниз, ноги чёрные и относительно длинные. В брачном наряде самец узнаваем по тёмно-кирпичному окрасу нижней части тела и темно-серой спине. Во всех сезонах при полёте заметны светлые полосы на крыльях и белое надхвостье — отличительный признак от чернозобика, у которого надхвостье тёмное. Самки окрашены бледнее: грудь и брюхо ржаво-серые, с заметной примесью белого цвета. Зимой оба пола имеют серо-бурую спину и грязновато-белую грудь. Молодые птицы окрашены однотонно, с более светлым низом.

Краснозобик населяет возвышенные участки равнинной тундры с лишайниково-моховым покровом, пушицевыми кочкарниками и зарослями карликовой берёзы, ивы и вересковых кустарничков, чередующимися с осоковыми понижениями и мелкими водоёмами. На зиму песочники улетают в Южное полушарие, где держатся в прибрежных зонах от Африки до Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Гнездящийся в северосибирских тундрах вид встречается на пролёте в долине Колымы и на Охотском побережье – как весной, так и осенью, но не часто. В небольшом количестве краснозобики летят через побережья дальневосточных морей; в Магаданской области изредка встречаются на Охотомосрком побережье.