



Малый веретенник/восточно-сибирский

Limosa lapponica menzbieri (Linnaeus, 1758)

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Кулик среднего размера, массой 195-275 г. Имеет длинный, слегка изогнутый вверх чёрный клюв и относительно короткие ноги. От большого веретенника отличается отсутствием белой полосы на крыльях и хвостом с чередующимися светлыми и тёмными полосами. Самцы окрашены ярче: верх тела бурый с охристыми пятнами, грудь и живот каштаново-коричневые. Самки крупнее, но менее яркие: их спина охристо-чёрная, грудь и бока бледно-охристые. Неразмножающиеся особи и молодые птицы имеют более однотонную серую окраску; нижняя сторона крыла украшена серыми полосками.

Малый веретенник предпочитает сухие и возвышенные участки тундры, встречается вдоль пологих предгорий и речных террас, поросших карликовыми ивами и пушицевыми кочкарниками. Гнездится в тундре и лесотундре на севере Сибири. Зимует в Юго-Восточной Азии, на островах Индонезии, в Австралии и Новой Зеландии. Во время миграции держится илисто-песчаных побережий и морских кос. На Охотском побережье становится заметным в период перелётов: взрослые особи пролетают с середины июля до начала августа, молодые – с середины до конца августа. В это время его можно встретить на Ольской лагуне и у берегов п-ова Кони.

Фото И. Дорогой