



Восточная ночница

Myotis petax Hollister, 1912

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae

Летучая мышь сравнительно мелких размеров: длина тела – 43-54 мм, хвоста – 31-44 мм, предплечья – 35-41 мм. Крыловая перепонка крепится к средней части плюсны; эпиблемы нет. Уши короткие, прижатые вперёд, не выступают за кончик носа. Козелок составляет менее половины длины ушной раковины, почти одинаковой ширины по всей длине, сверху закруглён. Окраска спины – однотонная, тёмно-серая, брюхо – белесоватое, с сероватым или палевым оттенком. Летательная перепонка тёмно-коричневая. Жилкование хвостовой перепонки образовано равномерными рядами сухожилий, между которыми видны «пятна» от волосяных фолликулов.

Восточная ночница охотится над водой, вылетая в сумерках. Предпочитает водоёмы, где летает группами на высоте 5-20 см над поверхностью. Питается мелкими двукрылыми в основном комарами, а также мелкими молями. Дальних миграций не совершает, зимует недалеко от мест летнего обитания. Зимует поодиночке или группами до 15 особей в пещерах, трещинах скал и искусственных подземных сооружениях. В Магаданской области отмечена в бассейне Чёломджи и на п-ове Кони.

Фото М. Чернила