



Верпа (шапочка) коническая

Verpa conica (O.F. Müll.) Sw. var. Conica

Порядок Пециевые – Pezizales

Семейство Сморчковые – Morchellaceae

Плодовое тело состоит из шляпки и ножки, высотой до 10 см. Шляпка высотой около 2,5 см, шириной 1-1,5 см, напоминает наперсток: сросшаяся только с острием ножки, со свободным белым краем, с вдавленной или прямой верхушкой; поверхность ровная, морщинисто-сетчатая или мелкоскладчатая, буро-коричневая сверху, белая снизу. Ножка стройная, 8-10×0,7-1,2 см, желтоватая, покрыта мелкими чешуйками или слабообсыпанная, очень хрупкая. Мякоть тонкая, ломкая. Споры эллипсоидные, гладкие, 22-25×11-15 мкм.

Растет в разных типах лесов и высокогорных тундрах, предпочитает пойменные и приручьевые сообщества с ивами. Плодоносит в июне–июле; в более южных регионах – в апреле-мае. Кальцефил, гумусовый сапротроф. Условно съедобен. Зарегистрирован в окрестностях Магадана (пойма р. Магаданка), Ольском районе (поймы р. Ола и Чёломджа).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019