



Гелиоцибе (лентинус, пилолистник) бороздчатый
Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead et Ginns (=*Lentinus sulcatus* Berk.)
Порядок Полипоровые – Polyporales
Семейство Полипоровые – Polyporaceae

Шляпка диаметром 1,4-3 см, распростёртая, иногда с приподнятыми краями; в центре кирпично-бурая, чешуйчатая, по краю широко радиально бороздчатая, кремовая с мелкими тонкими бурыми чешуйками, расположенными радиально. Пластинки белые или желтоватые, прикреплённые с выемкой, с неровным, зубчатым краем. Ножка 2-2,5×0,4-0,6 см, упругая, белая в верхней части, бурая в нижней, с редкими кирпично-бурыми чешуйками. Мякоть упругая, с слабым анизовым запахом и горьковатым вкусом. Споры крупные, фасолевидные, бесцветные, гладкие, неамилоидные, $5,6-6,5 \times 13,3-14,7$ мкм.

Растёт на оголённой (без коры) древесине тополя и осины, возможно – также чозении. Плодоносит в июле-августе. В других регионах отмечен на валежнике и обработанной древесине берёзы, реже – на древесине хвойных пород. Ксилотроф. Несъедобен. В Магаданской области известен в Ольском районе (среднее течение реки Чёломджа) и Среднеканском районе (верхнее течение реки Колыма).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019