



Ларицифомес (фомитопсис) лекарственный, лиственничная губка

Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar (=Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer)

Порядок Полипоровые – Polyporales

Семейство Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae

Плодовые тела многолетние, копытообразные или вытянуто-цилиндрические, плотные, твёрдые, с возрастом крошащиеся, до 20 см высотой и 16 см шириной, массой до 4 кг и более. Поверхность концентрически-бороздчатая, растрескивающаяся, сверху тёмно-серая, к основанию светлее, почти белая. Мякоть белая или желтоватая, горькая, с мучнистым запахом. Поры мелкие, округлые или угловатые, 3-5 на 1 мм. Споры эллипсоидные, желтоватые, 4,5-6,5×3-4 мкм.

Произрастает в зоне лиственничных лесов. В Магаданской области встречается в высокопойменных и долинных лиственничниках на старовозрастных и перестойных стволах лиственницы, преимущественно одиночно. Плодоносит круглогодично. Факультативный паразит, ксилотроф. Вызывает бурую кубическую сердцевинную гниль. Обладает лекарственными свойствами. В Магаданской области зарегистрирован в Ольском районе (долины рр. Чёломджа, Яна, Яма) и Хасынском районе (руч. Омчик).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019