



Летипорус (трутовик) серно-желтый

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Порядок Полипоровые – Polyporales

Семейство Фомитопсидные – Fomitopsidaceae

Плодовые тела однолетние, одиночные или черепитчатые, преимущественно широко прикрепленные. Шляпки вееровидные, до 20 см в диаметре, волокнисто-мясистые в свежем состоянии, в сухом – ломкие и лёгкие, сверху замшевые или тонко опушённые, сернисто-жёлтые или жёлто-оранжевые, часто с розовым оттенком по краю, при высыхании выцветающие до грязно-кремового. Вкус кисловатый, запах специфический. Гименофор сернисто-жёлтый, поры округлые, 2-4 на 1 мм. Споры яйцевидные или каплевидные, неамилоидные, 5-8×4-5 мкм.

Произрастает в зрелых высокопойменных лиственничниках на живых и сухостойных ствалах лиственницы, включая прикорневую зону. Плодоносит в июле-августе. В других регионах России отмечен на лиственных и хвойных породах: дуб (Европейская часть), лиственница (Сибирь), тополь (Средняя Азия), дуб и орех (юг Дальнего Востока). Паразит. Съедобен в молодом возрасте. Обладает лекарственными свойствами. В Магаданской области зарегистрирован в окрестностях Магадана (пос. Снежная долина), Ольском районе (пос. Клепка, оз. Солёное, п-ов Кони, долины рр. Ойра, Чёломджа, Яма) и Хасынском районе (верховья р. Ола).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019