



Онния войлочная

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

Порядок Гименохетовые – Hymenochaetales

Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae

Плодовые тела однолетние, с шляпкой и ножкой. Шляпка 3-8 см диаметром, более или менее округлая или неправильной формы, с лопастным краем, слегка вдавленная, незональная или иногда с неясными зонами по более светлому краю, войлочная, жёлто- или ржаво-бурая. Ножка центральная или эксцентрическая, 5,0×1,5 см, с войлочной поверхностью, пробково-кожистой консистенции, одного цвета со шляпкой. Ткань кожисто-волокнистая, золотисто-буроватая, зональная через всё плодовое тело. Гименофор пористый, с угловатыми неправильными порами, 2-3 на 1 мм, рыжевато-бурые. Споры широкоэллипсоидные, 3-5,5×3-4 мкм.

Произрастает в старых высокопойменных лиственничниках на погребённой в почву древесине лиственницы. Плодоносит в августе. Может расти у основания комлевой части и на корнях других хвойных пород – сосны, ели, кедра, пихты. Ксилотроф, вызывает белую гниль. Несъедобен. В Магаданской области известно единственное местонахождение – Ольский район, долина р. Чёломджа.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019