



### Подосиновик (обабок) арктоусный

*Leccinum arctoi* Vassilkov

Порядок Болетовые – Boletales

Семейство Болетовые – Boletaceae

Шляпка до 10 см диаметром, выпуклая, от кровяно-красного до красно-бурого цвета. Гименофор у молодых плодовых тел белый, с возрастом становится буроватым. Ножка 5-6×3-4 см, утолщённая к основанию, бочонковидная или каплевидная, с чешуйками, которые сначала светлые, белые, а с возрастом приобретают бурый или коричнево-бурый оттенок. Мякоть на разрезе сначала слегка розовеет, затем приобретает лёгкий лилово-синий оттенок; в отличие от других подосиновиков, практически не темнеет – наиболее «благородный» среди них. Споры веретеновидные, 12-18×3,5-4,5 мкм.

Растёт в кустарничково-лишайниковых тундрах вдоль побережья Охотского моря среди куртин арктоуса. Впервые описан Б. П. Васильковым по материалам с Чукотки. Микоризообразователь, симбионт арктоуса альпийского. Плодоносит с конца июня по начало сентября. Ценный съедобный гриб. Можно спутать с обабком жёлто-бурым (*L. versipelle*), также произрастающим в прибрежных сообществах среди зарослей берёзы Миддендорфа. В Магаданской области отмечен в окрестностях г. Магадана (п-ов Старицкого), Ольском (п-ов Кони) и Омсукчанском районах (вдоль Охотоморского побережья).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019