



Рыжик еловый

Lactarius deterrimus Gröger

Порядок Сыроежковые – Russulales

Семейство Сыроежковые – Russulaceae

Шляпка 3-10 см диаметром, оранжевая с тёмными серо-зелёными концентрическими кольцами; у старых плодовых тел появляются зелёные пятна на поверхности шляпки и ножке. Пластинки оранжево-жёлтые, с зеленоватыми пятнами. Ножка 3-7×1,5-2,5 см, одноцветная со шляпкой. Мякоть медленно зеленеющая. Млечный сок оранжевый, терпкий, медленно бледнеет. Вкус мягкий или слегка горьковатый, запах приятный. Споры эллипсоидные, хребтовидные, 7,5-10×6-7,5 мкм.

Произрастает в долинных и пойменных лесах ямского «елового острова». Микоризообразователь, образует микоризу с елью. Плодоносит в августе-сентябре. Съедобен, используется в народной медицине. В Магаданской области отмечен в Ольском районе (долина р. Яма). Вид выделяется по связи с *Picea* и характерному обилию зелёных пятен. Некоторые микологи рассматривают его как часть *Lactarius deliciosus*, однако генетические исследования подтверждают его самостоятельность.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019