



### Трутовик чозениевый

*Cerioporus choseniae* (Vassilkov) Zmitr. et Kovalenko

Порядок Полипоровые – Polyporales

Семейство Полипоровые – Polyporaceae

Плодовые тела однолетние, полукруглые, сrudиментарной ножкой, сначала мягкие, затем жестко-мясистые, одиночные или черепитчато расположенные. Шляпка вееровидная, 4-7 (до 15) см в диаметре, сверху покрыта тонкой блестящей кожицей, сначала коричневатая, затем жёлто-бурая, радиально-волокнистая или с мелкими тёмными прижатыми чешуйками. Ткань толстая, у молодых – мягкая, позже – пробково-кожистая, незональная, желтоватая. Гименофор мелкопористый, с 1-4 порами на 1 мм, поры округлые или слегка вытянутые. Споры веретеновидные, гладкие, с маслянистым содержимым, 8-10 × 3-4 мкм.

Растёт в поймах рек на сухостойных и валежных ствалах чозении (Chosenia arbutifolia), изредка – на иве (Salix schwerinii). Вне чозениевых лесов – на усыхающих и сухих ствалах видов Salix. Вызывает белую гниль. Ксилотроф. Съедобен в молодом возрасте. В Магаданской области известен в Ольском (поймы рек Ола, Армандь, Чёломджа, п-ов Кони, долина р. Хобота), Омсукчанском (окрестности пос. Омсукчан, пойма р. Омчикчан), Среднеканском (окрестности пос. Сеймчан, пойма р. Колыма) и Тенькинском (окрестности пос. Оротук) районах.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019