



Лобария ямчатая

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.

Порядок Пельтигеровые – Peltigerales

Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Слоевище листовое, довольно крупное, до 15 см в ширину, кожистое, слабо вырезанное, дольчато-лопастное. Доли до 4 см шириной, с широкоокруглёнными концами, цельные или мелкогородчатые. Верхняя поверхность светло-серовато-зелёная или желтовато-зелёная, матовая, неясно сетчато-ямчатая, с голубовато-серыми соралями, расположенными по краям, вдоль рёбер или по всей поверхности. Нижняя поверхность коротковолючочная, серовато-жёлтая, в центре – до буро-чёрной, с немногочисленными ризинами, заметными выпуклостями (соответствующими ямкам верхней поверхности) и белыми, порошистыми, разнообразными по форме и размеру псевдоцифеллами. Апотеции леканоровые, с красновато-коричневым диском. Размножается вегетативно – соредиями.

В пределах ареала распространён в лесной зоне, отмечен также в тундрах. В Магаданской области произрастает на стволах чозении и замшелых корнях лиственниц в тополево-чозениевых лесах и лиственничниках, на почве среди каменистых россыпей, а также на замшелых камнях в дриадовых щебнистых тундрах и на приморских склонах. Известен по находкам в Ольском районе: мыс Атарган и о. Недоразумения.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019