



Белокрыльник болотный

Calla palustris L.

Семейство Ароидные – Araceae

Прибрежно-водное многолетнее растение с ползучими побегами, высотой 10-25 см. Корневище толстое, ползучее, членистое, с мочковатыми придаточными корнями в узлах. Листья крупные, с черешками 5-20 см; на вегетативных побегах – одиночные, на цветущих – собраны в розетку. Пластина листа широкосердцевидная, заострённая, тёмно-зелёная, гладкая, блестящая, до 15 см длиной и 12 см шириной. Цветки многочисленные, обоеполые, собраны в плотные удлинённые терминальные початки до 45 см. Соцветия окружены белым, яйцевидным кроющим листом-покрывалом до 7 см длиной и 4,5 см шириной. Плоды – ярко-красные сочные ягоды, содержащие 6-8 семян.

Произрастает в заболоченных местообитаниях: старицах, пойменных и крупных термокарстовых озёрах, преимущественно мезотрофного типа. По берегам побеги и корневища стелются, переплетаются и формируют сплавины на поверхности воды. Размножается вегетативно – корневищами и отламывающимися почками возобновления, реже семенами. Все части растения ядовиты. В Магаданской области чаще встречается в Ольском районе: в междуречье рр. Кава и Чёломджа, а также на правобережье р. Кава.

Фото: А. Кондратьев