



Восковник пушистый

Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn.

Семейство Восковниковые – Myricaceae

Листопадный двудомный кустарник, сильно ветвящийся, высотой до 1 м. Кора ветвей тёмно-серая, молодые побеги – железисто опушённые. Листья очерёдные, продолговато-обратнояйцевидные, с клиновидным основанием, до 5,5 см длиной и 1,5 см шириной, по верхушке с немногочисленными зубцами; сверху тёмно-зелёные, снизу светлее, опушённые с обеих сторон. Цветки без околоцветника, собраны в тычиночные и пестичные серёжки на верхушках побегов. Тычиночные серёжки многочисленные, сидячие, до 1,2 см, с бурыми, светло окаймлёнными, железисто-опушёнными чешуями, в пазухах которых по 4 тычинки, сросшиеся у основания. Пестичные серёжки развиваются позже, немногочисленные, до 0,5 см (при плодах до 1,5 см длиной), с нитевидными пурпурными рыльцами. Пестик срастается у основания с двумя прицветными чешуями, образуя крылатую костянку. Плод – сухая сборная зеленоватая костянка.

Произрастает на осоково-сфагновых и осоково-пушищевых болотах, в заболоченных лиственничных редколесьях. Цветёт в июне, плодоносит в июле–сентябре. Размножается семенами; в культуре – летними черенками. В Магаданской области известен по трём местонахождениям в Ольском районе: наиболее крупная популяция – на побережье Мотыклейского залива между рр. Улукан и Маллер; также встречается в северо-западной части п-ова Пьягина, по долине р. Устье.

Фото: В. Покатайкин