



Ива грушанколистная

Salix pyrolifolia Ledeb.

Семейство Ивовые – Salicaceae

Высокий кустарник, реже дерево до 10 м. Ветви серо-каштановые, голые; молодые побеги желтовато-бурые, почти голые или рассеянно волосистые. Почки цветочные 5-9 мм, ланцетовидные, острые, часто с оттянутым «носиком», желтовато-бурые, голые. Прилистники крупные, до 16 мм, округло-почковидные или округло-сердцевидные, пильчатые, голые, неопадающие. Листовые пластинки тонкие, голые, сверху зелёные с бледносизым оттенком, 3-6 см длиной и 2-5 см шириной, округлые, широкояйцевидные или широкоэллиптические, с острой вершиной и округлым или сердцевидным основанием, по краю тонко пильчато-зубчатые. Мужские серёжки до 3,5 см, сидячие; прицветники около 2 мм, продолговатые, бледно-бурые, длинноволосистые; тычиночные нити до 7,5 мм, голые. Женские серёжки до 7 см, сидячие или почти сидячие, с несколькими опадающими чешуевидными листьями у основания. Завязи отклонены под прямым углом к оси серёжки или направлены к её основанию. Плоды 5-7 мм, веретеновидно-конусовидные, голые, с ≈14 семенами; семена ярко-зелёные, около 2 мм, слабоволосистые.

Произрастает в лиственничниках, пойменных ивняках, по берегам ручьёв, на заболоченных лугах, изредка – на известняковых скалах. В Магаданской области встречается преимущественно вблизи выходов кальцийсодержащих пород. Семена созревают во второй половине июня. В регионе отмечен спорадически в Тенькинском, Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах – по долине р. Колыма и её крупным притокам.

Фото: Красная книга Магаданской области 2019