



Кореянка земляничниколистная, чозения

Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. (*Salix arbutifolia* Pall.)

Семейство Ивовые – Salicaceae

Дерево с прямым стволом, быстро растущее, высотой до 37 м, с диаметром ствола до 30 см на высоте груди. Кора у молодых деревьев гладкая, серая, у старых – глубоко растрескивающаяся, отслаивающаяся пластина-ми. Ветви отходят почти от основания, прижатые, восходящие или раскидистые, голые, красноватые; молодые побеги с плотным сизым налётом. Листья ланцетные, 4-8 см длиной, 1-2 см шириной, к основанию суженные, по краю от середины мелкопильчатые или цельнокрайные, с обеих сторон голые, молодые – интенсивно сизые. Прилистников нет. Растение двудомное; мужские серёжки повислые, женские – восходящие, распускаются в начале июня, одновременно или немного раньше листвьев. Плод – коробочка 4-6 мм, собранная в серёжку. Семена зелёные, с белым хохолком, всхожесть сохраняется несколько месяцев. Размножается семенами, плодоносит обильно.

Произрастает на галечниках в руслах рек и на лёгких почвах в поймах, где формирует чозенники или растёт вместе с тополем, ивой росистой, ивой Шверина и лиственницей. Нередка на нарушенных участках с хорошим дренажом – на обочинах дорог, отвалах россыпной золотодобычи, включая дражные. В Магаданской области распространена повсеместно по долинам рек.

Фото: Сайт ИБПС ДВО РАН