



Страусник обыкновенный
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Семейство Оноклеевые – Onocleaceae

Папоротник высотой до 1,2 м с толстым, коротким корневищем и воронковидной розеткой из многочисленных вай, отмирающих на зиму. Внутренние вай – спороносные. Черешок трёхгранный, бледно-зелёный, у основания покрыт бурыми, перепончатыми, ланцетными чешуями длиной 1-1,5 см. Пластиинки стерильных (зелёных) вай тонкотравянистые, широкообратноланцетные, до 80 см длиной и 30 см шириной, резко и коротко заострённые, постепенно суженные к основанию. Перья 30-50 пар; они широколинейные, до 20 мм шириной, длиннозаострённые, сидячие, плотно перистораздельные. Сегменты – от продолговатых до узкообратнояйцевидных, 2,5-5 мм шириной, тупые или острогородчатые. Спороносные вай расположены в центре розетки, намного короче стерильных, прямые; черешок короче пластинки, широкобороздчатый сверху, сохраняющийся, по мере развития становится тёмно-бурым. Перья узколинейные, около 5 мм длиной, слабочетковидные. Споры развиваются почти на концах жилок, прикрыты завёрнутым краем вай и тонким чешуевидным покрывалом.

Произрастает на луговинах в пойменных тополево-чозениевых и ольхово-ивовых лесах, прирусовых кустарниковых зарослях, а также в высокотравных каменноберёзовых лесах и на лужайках вблизи термальных источников. В Магаданской области известен в Ольском районе – по рекам Тауй, Яма, а также на п-ове Кони (р. Умара).

Фото: О. Мочалова