



### Цинна широколистная

*Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.

Семейство Мятликовые – Poaceae

Многолетний высокий злак, высотой 1-1,5 м. Стебли гладкие, реже – слабошероховатые. Листовые пластинки шириной до 1 (реже до 2) см, плоские, шероховатые, с выдающейся светлой средней жилкой. Влагалища голые, шероховатые; язычки верхних листьев 3-6 мм. Метёлка крупная, рыхлая, раскидистая, 15-30 см длиной; ветви тонкие, шероховатые, с многочисленными светло-зелёными колосками. Колоски одн цветковые, 3-4 мм, сильно сплюснуты с боков. Колосковые чешуи равны цветковым или немного длиннее, одножильные, линейно-ланцетные, острые. Нижние цветковые чешуи трёхжильные, ланцетные, по килю тонкореснитчатые, на верхушке двузубчатые, с тонкой прямой остью 0,5-1,5 мм. Верхние цветковые чешуи – по килю с мелкими ресничками. Тычинка одна, реже две; пыльники продолговатые, завязь голая.

Произрастает по долинам рек в высокотравных и разнотравных ивовых, тополово-ивовых и смешанных лесах, а также в зарослях ольхи. Цветёт в конце июля – августе. В Магаданской области известен в Ольском районе – в бассейне Охотского моря: нижнее течение р. Тауй (окрестности пос. Талон), р. Чёломджа (от р. Хета до р. Кава).

Фото: Красная книга Магаданской области 2019